

# Utipro® plus

### Verwendungszweck

Das Medizinprodukt Utipro® plus ist zur Kontrolle und Prävention von Harnwegsinfekten (Blasenentzündung) vorgesehen, die durch Pathogene wie E.coli und andere, für gewöhnlich an der Entstehung von urologischen Infektionen beteiligte, gramnegative Bakterien verursacht werden.

Das Präparat auf Xyloglucan- (Hemicellulose) und Gelatinebasis wirkt mechanisch im Inneren des Darmes, indem der Kontakt der Krankheitserreger mit der Darmschleimhaut unterbunden wird – der erste Schritt um die Proliferation und die darauffolgende Übertragung auf die Harnwege zu hemmen.

Utipro® plus wird bei Auftreten der ersten Symptome von Harnwegsbeschwerden oral eingenommen, um die Proliferation der Pathogene zu hemmen, die zu Infektionen führen könnten. Bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten durch Proliferation des Pathogens ist das Produkt auch zur Vorbeugung solcher Episoden vorgesehen.

### Verpackung

Bllsterpackung mit 15 oder 30 Kapseln.

### Zusammensetzung

Jede Kapsel enthält: 100 mg Xyloglucan, 50 gr Schweinegelatine, 100 mg Propolis, 100 mg Hibiscus Sabdariffa, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (pflanzlich), Maisstärke.

### Anwendungshinweis

Die Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit schlucken.

### Dosierung

Patienten, bei denen erste Symptome eines Harnwegsinfekts auftreten, nehmen 2 Kapseln Utipro® plus am Tag über fünf Tage oral ein (1 Kapsel alle 12 Stunden).

Zur Vorbeugung von wiederkehrenden Infekten wird täglich eine Kapsel über mindestens 15 aufeinanderfolgende Tage pro Monat eingenommen. Gegebenenfalls kann die Behandlung wiederholt werden.

### Warnhinweise

- Die Diagnose einer Harnwegserkrankung muss von einem Arzt gestellt werden. Wenn die Symptome länger als 5 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Eine akute Harnwegserkrankung kann die Behandlung mit einem Antibiotikum erfordern. Dieses Produkt hat weder bakterizide noch bakteriolethale Eigenschaften und kann daher eine Behandlung mit Antibiotikum nicht ersetzen. Jedoch kann Utipro plus als Begleittherapie verabreicht werden.
- Sie sollten das Produkt während der Schwangerschaft und der Stillzeit nicht anwenden, sofern Ihr Arzt Ihnen nichts Gegenteiliges empfohlen hat.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Haltbarkeitsdatum.
- Nehmen Sie das Produkt nicht ein, wenn die Blister geöffnet oder beschädigt sind.
- Nicht über 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### Gegenanzeigen

Utipro® plus darf nicht bei Patienten angewendet werden, bei denen eine Überempfindlichkeit gegen Xyloglucan, Gelatine oder einen der Bestandteile des Produkts bekannt ist.

### Stand der Information

September 2019

Vertrieb in Deutschland durch:

**KLINGE**  
PHARMA

Klinge Pharma GmbH  
Bergfeldstr. 9  
83607 Holzkirchen- Deutschland



[www.utipro.de](http://www.utipro.de)

Hersteller:

NOVENTURE, S.L.  
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta  
08029 Barcelona - España